

Para personas a partir de los 6 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

DYANA VEL[®] XR CII

(amphetamine) extended-release

tablets 5 mg • 10 mg • 15 mg • 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

JUST
ONE

Una dosis. Un día completo de control de los síntomas del TDAH para niños y adultos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

DYANA VEL[®] XR (anfetamina) es una sustancia controlada federalmente (clasificación CII) porque contiene anfetamina, la cual puede ser objetivo de personas que abusan de medicamentos de venta con receta o drogas adictivas. DYANA VEL XR está sujeto a una alta probabilidad de abuso y uso indebido, y puede causar problemas de consumo de sustancias, incluida la adicción. Guarde DYANA VEL XR en un lugar seguro para prevenir el abuso y el uso indebido. Nunca entregue su DYANA VEL XR a otra persona, ya que puede causarle daños o la muerte. Vender o regalar DYANA VEL XR puede dañar a otras personas y está penado por la ley.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).



Vivir con TDAH puede ser desafiante, pero usted y su hijo no están solos



En Estados Unidos,

~11% de los niños tiene un diagnóstico actual de TDAH¹

~6% de los adultos se ve afectado por el TDAH²

El TDAH no se manifiesta solo en el trabajo o la escuela, sino que puede causar síntomas durante el día y hasta la noche, lo que afecta muchas áreas diferentes³

A menudo, se recomienda el uso de estimulantes para pacientes con TDAH, pero muchos factores pueden afectar la forma en que las personas responden a algunos medicamentos. No todos los medicamentos estimulantes funcionan igual ni duran la misma cantidad de tiempo.^{3,4}

Si necesita que su medicamento para el TDAH funcione de manera constante, durante todo el día y todos los días, DYANAVEL XR (anfetamina) puede ayudarlo debido a su fórmula única.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Su proveedor de atención médica debe evaluar el riesgo de abuso, uso indebido y adicción de usted o de su hijo antes de comenzar el tratamiento con DYANAVEL XR y los supervisará a usted o a su hijo durante el tratamiento.
- Si usted, su hijo o algún familiar han abusado alguna vez del alcohol, de medicamentos de venta con receta o de drogas adictivas, o han sido dependiente de estos, infórmeselo a su médico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

DYANAVEL XR ofrece **consistencia**

Descubra la administración avanzada de medicamentos para el TDAH con DYANAVEL XR (anfetamina) y obtenga 13 horas de control de los síntomas del TDAH durante el día con una sola dosis diaria.⁵

Los estudios clínicos y del mundo real demuestran los siguientes resultados:



Control demostrado de los síntomas que dura hasta 13 horas⁵



Liberación óptima y continua durante el día^{6,7}



Asociado con un menor uso de medicamentos de refuerzo de IR a los 90 días⁸

¿Cuál es la diferencia de DYANAVEL XR?

DYANAVEL XR se fabrica con un sistema de administración avanzado que libera el medicamento de forma continua.^{6,7}

Liberación inmediata a partir de partículas **sin recubrimiento**

Liberación prolongada mediante **recubrimientos** de varios grosores para una difusión continua

Con DYANAVEL XR, la liberación del medicamento no se ve afectada por:^{6,7,9}

- Consumo de alimentos
- pH del tracto gastrointestinal (GI)
- Lugar de liberación en el tracto GI
- Metabolismo de la anfetamina

Visite dyanavelxr.com para ver **cómo funciona DYANAVEL XR.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

No se debe utilizar DYANAVEL XR si usted o su hijo son alérgicos a la anfetamina o a cualquiera de los ingredientes de DYANAVEL XR, o bien si están tomando o han tomado en los últimos 14 días un medicamento llamado inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO), incluidos el antibiótico linezolid y el medicamento intravenoso azul de metileno. Si no está seguro de si usted o su hijo están tomando alguno de estos medicamentos, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

DYANA VEL XR es un tipo de anfetamina de liberación continua

Si necesita que su medicamento para el TDAH funcione de manera constante, **durante todo el día y todos los días**, DYANA VEL XR puede ayudar.



En un estudio con datos del mundo real, DYANA VEL XR se asoció con menos desequilibrios al final de la dosis, cuando el efecto del medicamento desaparece.⁸

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

DYANA VEL XR puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- **Riesgos para las personas que sufren enfermedades cardíacas graves:** Han ocurrido casos de muerte súbita en personas que tienen defectos cardíacos u otras enfermedades cardíacas graves. Antes de comenzar a utilizar DYANA VEL XR, informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen problemas o defectos cardíacos o enfermedades cardíacas.

Si durante el tratamiento con DYANA VEL XR, usted o su hijo presentan algún signo de problemas cardíacos como dolor en el pecho, dificultad para respirar o desmayos, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.

- **Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.**

El proveedor de atención médica debe controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca de usted y de su hijo regularmente durante el tratamiento con DYANA VEL XR.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

Eficacia DEMOSTRADA

DYANAVEL XR funciona
DURANTE 13 HORAS^{5,11}



Estudio del DYANAVEL XR en niños

Se estudió DYANAVEL XR (anfetamina) para evaluar la seguridad y el control de los síntomas durante el día.^{5,10}



- En un estudio en un salón de clases de laboratorio, se incluyó a 99 niños que tenían de 6 a 12 años con TDAH.⁵
- Profesores y calificadores evaluaron la eficacia utilizando la escala de calificación SKAMP*⁵
- El resultado principal de la prueba fue el cambio en la puntuación combinada de la escala SKAMP 4 horas después de que se tomó DYANAVEL. En otros resultados de pruebas, se analizó el cambio a las 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 horas después de tomar DYANAVEL.⁵

Los resultados



- Eficacia demostrada durante **13 horas**⁵
- Control **continuo** de los síntomas⁵
- Mejora **significativa** de la atención y el comportamiento⁵

*SKAMP es una escala de 13 ítems, evaluada por el profesor, de 7 puntos, en la que se miden las manifestaciones del TDAH en un salón de clases⁵

Estudio de DYANAVEL XR en adultos

En un estudio de doble ciego, se compararon los comprimidos de DYANAVEL XR (anfetamina) con placebo.

91 participantes adultos completaron el estudio realizando una serie de pruebas de medición permanente del rendimiento (PERMP, por sus siglas en inglés) para evaluar la atención y el rendimiento durante el día.¹¹ El estudio reveló los siguientes resultados:



- **DYANAVEL XR** ofrece una eficacia comprobada y un control constante de los síntomas del TDAH durante todo el día¹¹

Se demostró la eficacia de DYANAVEL XR en el tratamiento del TDAH, con efectos secundarios comunes como los que se observaron con otros estimulantes para el TDAH.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).


Disponible en
**FORMULACIONES
LÍQUIDAS y EN
COMPRIMIDOS** para una
dosificación personalizada¹⁰



DYANAVEL[®]XR II
(amphetamine) extended-release
tablets 5 mg • 10 mg • 15 mg • 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

Suspensión oral de DYANAVEL XR

Las opciones de dosificación de DYANAVEL XR (anfetamina) en Suspensión oral se pueden ajustar en pequeñas cantidades según lo recetado.



¿Sabía que...?

DYANAVEL XR tiene **sabor a goma de mascar** tanto en su formulación líquida como en comprimidos.

Con DYANAVEL XR, puede cambiar fácilmente de la suspensión oral a los comprimidos con solo pedírselo a su proveedor de atención médica.¹⁰

Descubra una dosificación flexible que satisfaga las necesidades de su hijo

- Su proveedor de atención médica puede iniciar el tratamiento con DYANAVEL XR en una dosis baja y personalizar la dosis ajustándola a una mayor o menor según la respuesta al tratamiento
- La Suspensión oral de DYANAVEL XR incluye un dosificador oral que lo ayudará a medir la cantidad de medicamento
- DYANAVEL XR debe tomarse por vía oral una vez al día por la mañana
- DYANAVEL XR se puede tomar con o sin alimentos
- Tome la Suspensión oral de DYANAVEL XR exactamente como se le recetó y recuerde agitar bien el frasco (de arriba abajo) antes de cada uso

Comprimidos de DYANAVEL XR

Se ofrecen **cuatro opciones de dosificación del comprimido**, incluido uno de 5 mg que se puede dividir en dos. Puede trabajar en conjunto con su proveedor de atención médica a fin de encontrar la opción que funcione para usted.¹⁰ Los comprimidos de DYANAVEL XR se pueden **tragar o masticar**.¹⁰

5 mg



El comprimido ranurado se puede dividir para obtener una dosis de 2,5 mg

10 mg



Ningún comprimido se muestra en tamaño real.

15 mg



20 mg



Cómo tomar DYANAVEL XR

Lea las Instrucciones de Uso de DYANAVEL XR que le entregó su farmacéutico antes de tomarlo y cada vez que surta el medicamento, de modo que disponga de las instrucciones más actualizadas.

Si tiene alguna pregunta, hable con su proveedor de atención médica.

Consulte la [Guía de Medicamentos](#) y las [Instrucciones de Uso](#) para obtener instrucciones específicas sobre cómo tomar DYANAVEL XR

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

DYANAVEL XR puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes (continuación):

- **Problemas mentales (psiquiátricos), incluidos** trastornos del comportamiento y del pensamiento recientes o agravados, trastorno bipolar reciente o agravado, síntomas psicóticos recientes (como escuchar voces, o ver o creer cosas que no son ciertas) o síntomas maníacos de aparición reciente. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier problema de salud mental que tengan usted o su hijo, o sobre antecedentes familiares de suicidio, trastorno bipolar o depresión. **Llame al médico de inmediato si detecta síntomas mentales de aparición reciente o agravados durante el tratamiento** con DYANAVEL XR, **especialmente si escucha voces, ve o cree cosas que no son ciertas, o si presenta nuevos síntomas maníacos.**
- **Problemas de circulación en los dedos de las manos y de los pies (vasculopatía periférica, incluido el fenómeno de Raynaud).** Infórmele a su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan entumecimiento, dolor, cambio de color de la piel o sensibilidad a la temperatura en los dedos de las manos o de los pies.
Llame al médico de inmediato si usted o su hijo presentan signos de heridas inexplicables que aparecen en los dedos de las manos o de los pies durante el tratamiento con DYANAVEL XR.
- **Tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado.** Infórmele a su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado durante el tratamiento con DYANAVEL XR.
- **Síndrome de la serotonina.** Este problema puede ocurrir cuando DYANAVEL XR se toma con ciertos otros medicamentos y puede ser potencialmente mortal. Deje de tomar DYANAVEL XR y llame a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de urgencias del hospital más cercano si presenta síntomas como agitación, alucinaciones, coma u otros cambios en el estado mental; ritmo cardíaco acelerado; sudoración o fiebre; náuseas, vómitos o diarrea; presión arterial alta o baja; problemas para controlar los movimientos o contracciones musculares; rigidez u opresión muscular.
- **Ralentización del crecimiento (estatura y peso) en los niños.** Durante el tratamiento con DYANAVEL XR, debe medirse con frecuencia la estatura y el peso de los niños. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DYANAVEL XR de su hijo si no está creciendo o aumentando de peso como se espera.
- No se sabe si DYANAVEL XR es dañino para los fetos. Antes de tomar DYANAVEL XR, informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada. Existe un registro de embarazos de mujeres expuestas a DYANAVEL XR durante el embarazo. El objetivo del registro es recopilar información sobre el estado de salud de las mujeres y sus bebés expuestos a DYANAVEL XR. Si usted o su hija queda embarazada durante el tratamiento con DYANAVEL XR, hable con su proveedor de atención médica con el fin de inscribirse en el Registro Nacional de Embarazos para Psicoestimulantes llamando al 1-866-961-2388 o visitando <https://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/othermedications/>.
- DYANAVEL XR se transfiere a la leche materna. Ni usted ni su hijo deben estar en período de lactancia durante el tratamiento con DYANAVEL XR. Infórmele a su médico si está amamantando o planea amamantar.

Entre los efectos secundarios más comunes de los productos anfetamínicos, se incluyen los siguientes:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| - boca seca | - náuseas | - mareos |
| - disminución del apetito | - problemas para dormir | - aumento de la frecuencia cardíaca |
| - pérdida de peso | - inquietud | |
| - dolor de estómago | - cambios de humor extremos | |

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DYANAVEL XR.

Hable con su médico si usted o su hijo presentan algún efecto secundario que les cause inquietud o que no desaparezca.

Evite beber alcohol mientras toma DYANAVEL XR.

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).



DISPONIBILIDAD
garantizada.
ENTREGA gratuita.

DYANAVEL[®]XR 
(amphetamine) extended-release
 tablets 5 mg • 10 mg • 15 mg • 20 mg



Pregúntele a su médico cómo puede conseguir fácilmente sus comprimidos de DYANAVEL XR (anfetamina)



DISPONIBILIDAD GARANTIZADA

Perigon Pharmacy 360 trabaja directamente con Tris Pharma para garantizar que los comprimidos de DYANAVEL XR estén siempre disponibles



ENTREGA RÁPIDA Y GRATUITA

Los comprimidos de DYANAVEL XR se enviarán directamente a la dirección que haya elegido, sin gastos de envío (se requiere la firma)



APOYO AL PACIENTE

Llame al **1.844.698.2533** (los residentes de California deben llamar al **1.850.874.2025**)

¿Qué pagará?

- **PAGUE TAN SOLO \$25 AL MES** con un programa de ahorro de copago* si su seguro comercial cubre los comprimidos de DYANAVEL XR
- **\$100 AL MES** para los pacientes elegibles que decidan pagar en efectivo**

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN DYANAVEL.COM/DELIVERED

USO APROBADO

DYANAVEL XR es un medicamento de venta con receta estimulante del sistema nervioso central (SNC) que se utiliza para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en personas a partir de los 6 años. DYANAVEL XR puede ayudar a aumentar la atención y disminuir la impulsividad e hiperactividad en personas con TDAH.

No se recomienda el uso de DYANAVEL XR en niños menores de 6 años con TDAH.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

Cuestionario sobre el rebote de los síntomas vespertinos del TDAH

- 1 ¿Sus síntomas del TDAH reaparecen por la tarde? Si / No
- 2 ¿Le resulta difícil concentrarse al final del día con sus medicamentos actuales para el TDAH? Si / No
- 3 ¿Le gustaría que el medicamento para el TDAH actuara por más tiempo? Si / No
- 4 ¿Está cansado de planificar su día en función de los medicamentos de refuerzo? Si / No

Si alguna de estas preguntas se ajusta a su caso, hable con su profesional de atención médica sobre cómo DYANA VEL XR podría ayudar.

¡Únase a nuestra comunidad!



Learn more



Reciba correos electrónicos



Conéctese en Instagram



Comparta su historia

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).

JUST ONE

DYANAVEL[®]XR[®]
(amphetamine) extended-release
tablets 5 mg • 10 mg • 15 mg • 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

Programa de Ahorros TRIS

¡Pídale a su proveedor de atención médica una Tarjeta de Ahorro!

Descubra cómo puede pagar tan solo \$25* por cada receta médica en trissavingscard.com

* Se aplican términos y condiciones. La emisión de la tarjeta está sujeta a los requisitos. Visite trissavingscard.com/terms para obtener más información.



Referencias: **1.** Danielson ML, et al. ADHD Prevalence Among U.S. Children and Adolescents in 2022: Diagnosis, Severity, Co-Occurring Disorders, and Treatment. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*. 2024 53(3), 343–360 **2.** Staley BS, Robinson LR, Claussen AH, et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis, Treatment, and Telehealth Use in Adults — National Center for Health Statistics Rapid Surveys System, Estados Unidos, octubre-noviembre del 2023. US Department of Health and Human Services. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. MMWR. 10 de octubre del 2024. Vol. 73, N.º 40. **3.** Jain R. Addressing diagnosis and treatment gaps in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Prim Care Companion CNS Disord*. 2017;19(5):17nr02153. **4.** Ermer JC, Adeyi BA, Pucci ML. Pharmacokinetic variability of long-acting stimulants in the treatment of children and adults with attention-deficit hyperactivity disorder. *CNS Drugs*. 2010;24(12):1009-1025. **5.** Childress AC, et al. Efficacy and safety of amphetamine extended-release oral suspension in children with Attention deficit/hyperactivity disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol*. 2018;28(5):306-313. **6.** Pardo A, et al. Single-dose pharmacokinetics of amphetamine extended-release tablets compared with amphetamine extended-release oral suspension. *CNS Spectr*. 2020;25(6):774-781. **7.** Cutler AJ, Hanaie J. Understanding the delivery technology used in ADHD stimulant medications can help to individualize treatment. *CNS Spectrums*. 2025;30(1):e30. **8.** Young JL, Powell RN, Powell A, Welling LLM, Granata L, Saal J, Nash M. Extended-release amphetamine (Dyanavel XR) is associated with reduced immediate-release supplementation in adults with ADHD, regardless of baseline patient variables: a retrospective cohort analysis of medical treatment records. *BMC Psychiatry*. 3 de enero del 2025;25(1):12. **9.** Powell JJ, Greenfield SM, Thompson RP. Concentrations of metals in gastric juice in health and peptic ulcer disease. *Gut*. 1992;33(12):1617-1620. **10.** DYANAVEL XR [prospecto del envase]. Tris Pharma, Inc., Monmouth Junction, NJ. **11.** Cutler AJ, Childress AC, Pardo A, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study to evaluate the efficacy and safety of amphetamine extended-release tablets in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Clin Psychiatry*. 2022;83(5):22m14438.

Consulte la Información importante de seguridad adicional completa y la [Información completa de prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, además de la [Guía del medicamento](#).



DYANAVEL es una marca comercial registrada de Tris Pharma, Inc.
© 2026 Tris Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. DXR.ES.2927.PR 02/26